

Профилактика африканской чумы свиней

Как предотвратить занос вируса АЧС?

Африканская чума свиней (болезнь Монгомери) - особо опасная, острозаразная болезнь свиней, вызываемая ДНК содержащим вирусом из семейства *Asfarviridae*, рода *Asfivirus*. Болеют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов в любое время года. Вирус очень устойчив - в продуктах, воде и почве во внешней среде сохраняется месяцами, при замораживании и высушивании - годами. Погибает при нагревании до высоких температур.

Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб. В первичных очагах погибает до 100% заболевших свиней. Лечение животных запрещено, вакцины в мировой ветеринарии не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими, через контаминированный корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода. Вирус АЧС переносит домашние и дикие животные, птицы, грызуны, насекомые: клещи, блохи, вши.

Помните! Наименее часто к заболеванию АЧС приводит скормливание свиньям непроваренных пищевых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

Клиническая картина

До появления первых признаков 5-15 дней. У заболевших свиней температура тела до 42°C, появляется одышка, кашель, исчезает аппетит, усиливается жажда, отмечается рвота, паралич задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, живота, шеи, у основания ушей, на пятке и хвосте появляются разлитые красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает через 1-5 дней после появления клинических признаков болезни.

При установлении диагноза АЧС на хозяйство, населенный пункт накладывается карантин. Всех свиней в очаге инфекции убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, ветхие помещения, деревянные полы сжигают на месте.

В радиусе не менее 5 км от эпизоотического очага (1 угрожаемая зона) все свиньи изымаются и вывозятся специально оборудованным транспортом на ближайший закрепленный для убой мясокомбинат. Запрещается продажа на рынках продуктов животноводства и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина. Разведение свиней в хозяйствах, населенных пунктах разрешается только через год после снятия карантина.

В своей деятельности владельцы животных должны придерживаться приказа Министерства сельского хозяйства РФ "Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации» от 29 марта 2016 г. № 114

С целью обеспечения благоприятного эпизоотического статуса свиноводческих хозяйств различного типа и предо-твращения распространения заразных болезней животных на территории Российской Федерации необходимо применить систему компартментов и стремиться повышать его уровень (Приказ Минсельхоза России от 23.07.2010 № 258 "Об утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства").

- Не допускайте кормления свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки;
- Обеспечьте безвыгульное содержание свиней, исключите их контакт с другими животными;
- Не допускайте посторонних лиц и въезд автотранспорта в хозяйства;
- Не покупайте свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов.
- Не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;
- Соблюдайте требования по убою животных, хранению, транспортировке и реализации продуктов и сырья животного происхождения;
- Обязательно предоставляйте для ветеринарного осмотра и ветеринарных обработок имеющиеся поголовье;
- Соблюдайте требования по сбору и утилизации (уничтожению) биологических отходов;
- Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней немедленно сообщите специалистам ветеринарной службы.

Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её распространение виновные несут ответственность в соответствии с законодательством РФ!

